

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® HCPCh +FeLV

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Virus de la Rinotraqueítis Felina (FVR), Cepa 593-J $\geq 10^{4.7}$ PFU Calicivirus Felino (FCV) Cepa 894-T $\geq 10^{3.1}$ PFU Virus de la Panleucopenia Felina (FPL) cepa Philips $\geq 10^{3.0}$ FAID ₅₀ <i>Roxane Chlamydia psittaci</i> , (FPn), Cepa Baker $\geq 10^{2.5}$ YSLD ₅₀ Virus de la Leucemia Felina (FeLV), Aislamiento Rickard ≥ 1.0 RP
-----------------	--

PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis acompañado por diluyente estéril.
--------------------------------	---

INDICACIONES:	Nobivac® HCPCh + FeLV se recomienda para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por los virus de la rinotraqueitis felina, calicivirus felino y panleucopenia felina; y la Clamidiasis producida por <i>Chlamydia psittaci</i> . Se recomienda para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de los tumores linfoides y las enfermedades asociadas con la infección por el virus de la leucemia felina (FeLV). La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus virulento de la leucemia felina. Nobivac® HCPCh + FeLV es una vacuna combinada que une los beneficios de Nobivac® HCPCh y Nobivac® 2-FeLV en una aplicación.
----------------------	--

FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIES DESTINO:

Felinos domésticos

FORMA FARMACÉUTICA:

Liofilizado y solvente en suspensión inyectable.

DESCRIPCIÓN:

Vacuna contra Leucemia Viral Felina, Rinotraqueitis, Viral Felina, Calicivirus, Panleucopenia y Clamidiasis por *Chlamydia psittaci*

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Antes de utilizar, permita que Nobivac® 2-FeLV alcance la temperatura ambiente; agitar bien.
Transferir el contenido del vial de Nobivac® 2-FeLV al vial de Nobivac® HCPCh asépticamente.
Mezclar suavemente hasta que se disuelva. Usar todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.
Se requieren dos dosis para la inmunización primaria.
Para la vacunación inicial: Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular a las 9 semanas de edad o mayores.
Segunda vacunación: Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial.

Revacunar cada dos años con una sola dosis de Nobivac® HCPCh + FeLV.

Se recomienda la revacunación en los años intermedios con Nobivac® HCPCh.

Los estudios indican que los gatos vacunados con Nobivac® HCPCh + FeLV están protegidos contra la viremia persistente FeLV durante al menos dos años después de la vacunación.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar hembras preñadas.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.



2

<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacene entre 2° y 7°C. NO CONGELE. Protéjase de la luz.	
PERIODO DE RETIRO:	
No aplica.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. EE.UU.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.